

## Pflanzenschutzmittel gegen Buchsbaumzünsler im Haus- u. Kleingarten

reg Nr.	Mittel	Wirkstoff	Kontentration	Abstand zu Gewässern	Wirkungstyp	Wirkstoffgruppe	Zulassung gegen	Zugelassen im Haus- u. Kleingarten
D: 5686-00	<b>Schädlingsfrei Careo Combigranulat</b>	Acetamiprid 5 g / lt.	6 ml in 600 ml Wasser / 10 m <sup>2</sup>		Fraß, Kontakt, systemisch	Neonicotinoid	Insektizid	<b>Haus und Kleingarten</b>
D: 4436-00	<b>Neem Azal TS</b>	Azadirachtin 10 g/lt.	1,5 ml auf 1000 ml Wasser / 10 m <sup>2</sup> gegen Raupen bis 2 cm große		systemisch, schwierig bei versteckter Lebensweise, wirkt gut gegen kleine	Biologische Wirkstoffe	Beißende Insekten	<b>Haus und Kleingarten</b>
Ö: 2838/1	<b>Schädlingsfrei Parexan</b>	Piperonylbutoxid 144 g/lt. + Pyrethrine 36 g/lt.	1 ml auf 1000 ml Wasser / 10 m <sup>2</sup> , nach 7 Tagen wiederholen	40 m !	Fraß, Kontakt	Pyrethrine und Wirkungsverstärker	Freifressende Schmetterlingsraupen, beißende Insekten	<b>Haus und Kleingarten</b>
Ö: 2838/0	<b>Spruzit Käfer u. Raupenfrei</b>				Fraß, Kontakt			<b>Haus und Kleingarten</b>
D: 4780-64	<b>Compo Schädlings-frei plus</b>	Pyrethrine 4,59 g/lt. Rapsöl 825,3 g/lt.	6 ml auf 1200 ml Wasser / 10 m <sup>2</sup> , nach 7 Tagen wiederholen, nicht bei Sonne spritzen		Fraß, Kontakt	Pyrethrine und Rapsöl	Beißende Insekten	<b>Haus und Kleingarten</b>
D: 6157-64	<b>Bayer Garten Gießmittel geg. Schädlinge Calypso</b>	Thiacloprid 9 g / lt.	20 ml in 1000 ml Wasser / 10 m <sup>2</sup> , nach 10 - 14 Tagen wiederholen	5 m	Fraß, Kontakt, systemisch	Neonicotinoid	Beißende Insekten	<b>Haus und Kleingarten</b>
D: 6157-61/00-003	<b>Bayer Garten Kombi-Rosen-Schädlingsfrei</b>							<b>Haus und Kleingarten</b>

Diese Aufstellung erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit.

Stand: 16.8.2010

Die befallenen Pflanzen sind von innen nach außen vollständig tropfnass zu spritzen. Bei dichten Beständen muß mit Hilfe eines Stockes das Laub zur Seite gedrückt werden, um auch ins Herz der Pflanze zu kommen.

Regelmäßige Kontrollen und eine wiederholte Behandlungen nach etwa 7 - 10 Tagen erhöhen den Erfolg der Bekämpfung.

**Bitte beachten Sie die Angaben des Beipaktextes der Pflanzenschutzmittel!**